



FICHA DE PRODUCTO

Animales Mayores

Nombre del producto.	NEGUVON
Ingredientes.	Trichlorfon 96% (Organofosforado).
Uso.	Ectoparásitos: Piojos, Sarna, Pulgas, Moscas y sus larvas. Endoparásitos: Gasterophilus spp. ("barrilitos"), Haemonchus spp., Mecistocirrus, Cooperia spp., Trichostrongylus spp., Ostertagia spp., Oesophagostomun spp., áscaris en caballos.
Vía de administración.	Tópica, Oral.
Especies de destino.	Bovinos y equinos.
Dosis o dilución.	La dosificación varía de acuerdo al parásito a controlar. En general, para uso externo (baño o aspersión) se diluye un sobre de 15 gr. en 10 litros de agua. Neguvon puede mezclarse con el alimento o disolverse en agua tibia (máx.: 40° C) para dosificación oral. Dosis general: Dilución al 10% (15 gr. en 150 ml. de agua). Bovinos: 50 ml. x 10 kg. P.V. Equinos: 35 ml. x 100 kg. P.V.
Contraindicaciones.	No administrar inhibidores de la colinesterasa 10 días antes ni 10 días después post tratamiento.
Antídoto (si corresponde).	Antídoto: Sulfato de atropina.
Otros.	