



FICHA DE PRODUCTO

Animales Menores

Nombre del producto.	NOBIVAC RABIA																	
Composición	Componente activo por dosis: Virus Rabia cepa Pasteur: induce al menos 2 U.I en la prueba de potencia.																	
Presentación.	Caja con 10 dosis. Caja con 50 dosis.																	
Descripción	Nobivac® Rabia contiene un cultivo inactivado de virus Rabia, clonado de la cepa Pasteur RIV con una potencia de ? 2 U.I. El virus es propagado en la línea celular BHK-21 clon CT e inactivado con betapropiolactona. Se presenta como una vacuna con fosfato de Aluminio como adyuvante.																	
Vía de administración, Dosis o dilución.	Ver tabla en Otros.																	
Especies de destino.	Para la inmunización activa de perros, gatos, vacas, ovejas, cabras, zorros, hurones y caballos sanos contra la Rabia.																	
Precauciones y/o Contraindicaciones.	Condiciones de Almacenamiento La vacuna debe mantenerse en la oscuridad a temperatura entre +2°C y +8°C. Evite congelar. Para la presentación de 10 dosis, los frascos abiertos deben ser usados dentro del primer día de trabajo. Precauciones y Advertencias Permita que la vacuna alcance la temperatura ambiente (15-25º C) antes de usar. Use equipo de inyección estéril. Agite antes y durante el uso. Ocasionalmente después de la vacunación puede ocurrir una moderada reacción de hipersensibilidad tipo anafiláctica. Este tipo de reacción puede ocurrir después de la inyección de cualquier proteína extraña y es, en la mayoría de los casos, auto limitante. Deben vacunarse sólo perros sanos y se debe realizar un examen clínico adecuado antes de la inoculación. Manténgase lejos del alcance de los niños. Venta solo a Médicos Veterinarios.																	
Antídoto (si corresponde).	N/A.																	
Otros.	<table><tr><td>Perros/Gatos</td><td>Bovinos/Caballos</td><td>Zorros</td><td>Ovinos/Caprin</td><td>Hurones</td><td></td></tr><tr><td>Vacunación primaria a una edad</td><td>3 meses*</td><td>6 meses*</td><td>3 meses*</td><td>6 meses*</td><td>3 meses*</td></tr></table>						Perros/Gatos	Bovinos/Caballos	Zorros	Ovinos/Caprin	Hurones		Vacunación primaria a una edad	3 meses*	6 meses*	3 meses*	6 meses*	3 meses*
Perros/Gatos	Bovinos/Caballos	Zorros	Ovinos/Caprin	Hurones														
Vacunación primaria a una edad	3 meses*	6 meses*	3 meses*	6 meses*	3 meses*													



FICHA DE PRODUCTO

Animales Menores

Precauciones y/o Contraindicaciones.	No debe administrarse a animales con antecedentes de hipersensibilidad a clindamicina y a la lincomicina. Se puede observar antagonismo con el cloramfenicol y los macrólidos, que ejercen la misma acción el el sitio de la subunidad ribosomal 50S. Se ha reportado actividad sinérgica entre la clindamicina y la ceftazidima, el metronidazol y la ciprofloxacina, contra algunas bacterias anaerobias. No se ha reportado toxicidad grave en órganos, pero trastornos gastrointestinales, que pueden volverse severos, ocurren con dosis más elevadas. Mantener fuera del alcance de los niños. Venta bajo receta Médico Veterinaria.
Antídoto (si corresponde).	N/A.
Presentación.	Estuche con 20 tabletas ranuradas en Blister de 10 tabletas cada uno.

